


Les contraceptions mécaniques

Le préservatif et les IST

Préservatif masculin



Anatomie de l'appareil génital masculin adulte au repos



Préservatif féminin



GONADES:

VOIES GENITALES

INTERNES:

-Trompe utérine

Pavillon

- Cavité

- Muqueuse

(endomètre) Utérus

Muscles

(myomètre)

- Col

-Vagin

Uretère

Vessie

Urètre

ORGANES GENITAUX

EXTERNES:

Corps

Érectiles

Clitoris } Prépuce

Gland

Orifice urinaire


grandes lèvres

Petites lèvres

Orifice vaginal

C

Vulve



Préservatifs masculins et féminins: seule contraception contre les IST

Les femmes préfèrent les hommes
qui savent les protéger.



Les préservatifs protègent du virus du sida et
des infections sexuellement transmissibles.
Appelez Sida Info Service au 0800 840 800

Appel gratuit et anonyme

COLLECTION CHIFFES IUT

inpes

Les femmes préfèrent les hommes
qui savent les protéger




Les préservatifs protègent du virus du sida et
des infections sexuellement transmissibles.
Appelez Sida Info Service au 0800 840 800

Appel gratuit et anonyme

COLLECTION CHIFFES IUT

inpes

Les IST: le SIDA



4 Infection d'une cellule par le VIH (MEB, image colorisée).

En bleu et rose : cellules non infectées ; en jaune foncé : cellule immunitaire infectée ; en jaune clair : VIH. Le virus, en tuant des cellules immunitaires, affaiblit les défenses de l'individu, ce qui peut aboutir au développement du SIDA. Pour en savoir plus, rendez-vous [chapitre 17, activité 2](#).




3 Une campagne d'incitation au dépistage du VIH.

Le dépistage consiste à rechercher des anticorps contre un pathogène. La personne est dite séropositive en présence de ces anticorps. Le dépistage du VIH est gratuit et anonyme, le site www.sida-info-service.org donne les adresses des centres les plus proches.



Les IST: le HPV



7 Observation au microscope électronique de particules virales du papillomavirus.

Image colorisée.


5 Présentation du papillomavirus (virus HPV)

Les papillomavirus constituent un ensemble d'une centaine de virus. Pour une quarantaine d'entre eux, la contamination est possible lors d'un rapport sexuel avec ou sans pénétration. On estime que plus de 70 % des individus sexuellement actifs rencontreront ce type de virus au moins une fois dans leur vie. La présence de deux de ces virus est impliquée dans 70 % des cas du cancer du col de l'utérus. Chaque année, en France, 3 000 nouveaux cas de ce cancer et 1 000 décès sont enregistrés.

Femmes non vaccinées	Femmes vaccinées
164/10 000	2/10 000

6 Proportion de femmes présentant des lésions précancéreuses liées au HPV.

Les lésions peuvent évoluer en cancer du col de l'utérus. La vaccination contre le HPV est recommandée pour les filles entre 11 et 14 ans.



Webographie

- <https://www.onsexprime.fr/Sexe-sante/La-contraception-fais-ton-choix/>
- <http://www.macontraception.fr>
- <http://www.choisirsacontraception.fr/> (*redirigé vers <https://questionsexualite.fr/choisir-sa-contraception>*)
- <https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/Fiche.aspx?doc=moyens-de-contraception>
- <http://www.contraceptionmasculine.fr/les-methodes/la-chm/>